




ИНСТРУКЦИЯ  
по применению профилактического гигиенического средства  
Мужские ректальные суппозитории  
**SCHALI® Care-ML**  
Заболевания органов дыхания



**ИНСТРУКЦИЯ**  
**по применению профилактического гигиенического средства**  
**Мужские ректальные суппозитории**  
**SCHALI® Care-ML**  
**Заболевания органов дыхания**

Мужские ректальные суппозитории SCHALI® Care-ML обладают общеукрепляющим, общестимулирующим, противомикробным действием и антитоксическим действием, усиливают иммунный ответ организма и предназначены для лечения и профилактики заболеваний органов дыхания.

**ФОРМА ВЫПУСКА:**

Капсулы жировые профилактические, 2 г.

**СОСТАВ:**

Состоит из экоблагоприятных биокомпонентов растительно-минерального происхождения.

Масло какао, тыквенное масло, прополис, экстракт цветков ромашки, экстракт корня женьшеня, экстракт корня солодки, экстракт семян гриффонии простолистной, витамин Е, двуокись титана.

**МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ:**

Суппозитории на основе натуральных растительных масел, минералов и растительных компонентов, растворяясь постепенно в прямой кишке, всасываются в слизистую нижних отделов прямой кишки, оказывая противовоспалительное, регенерирующее действие, а также укрепляют стенки сосудов и улучшают кровоток в капиллярах. Растительные и минеральные компоненты суппозитория и их составляющие оказывают влияние на синтез бронхиального секрета, выделяемого клетками слизистой оболочки бронхов, влияют на альтеративную и экссудативную фазы воспаления, препятствуя распространению воспалительного процесса.

Антибактериальное и антимикробное действие двуокиси титана основывается на ее способности дезактивировать ненасыщенные химические связи пептидов, гликозидов и тому подобных, обеспечивая удаление поступающих извне экзогенных или изнутри эндогенных вредных токсических соединений. Это в свою очередь, оказывает выраженный эффект устранения симптомов различных патологий воспалительного характера. Посредством угнетения активности циклооксигеназы – основного фермента возникновения воспаления, боли и лихорадки, оказывается подавляющее действие на причину воспаления.

Регулярное применение суппозитория оказывает антипролиферативное действие, нацеленно ограничивая миграцию моноцитов в очаг воспаления и торможение пролиферации фибробластов.

Активные компоненты суппозитория также оказывают противоаллергическое действие в результате снижения синтеза и секреции медиаторов аллергии, торможения высвобождения из сенсibilизированных тучных клеток и базофилов гистамина и других биологически активных веществ, уменьшения числа циркулирующих базофилов, подавления пролиферации лимфоидной и соединительной ткани, уменьшения количества Т- и В-лимфоцитов, тучных клеток, снижения чувствительности эффекторных клеток к медиаторам аллергии, угнетения антителообразования, изменения иммунного ответа организма.

Фармакологические свойства полифенолов, содержащихся в цветках ромашки, определяются их вяжущим действием. Полифенолы практически не проникают внутрь клеток и не всасываются. Они коагулируют белки, одевающие тонким слоем слизистые и их крипты (секреты желез и прочие). Количество белков резко увеличивается при воспалении слизистых,

на обожженной либо поврежденной механически или иным способом кожной поверхности.

Экстракт корня солодки, содержащийся в препарате проявляет отчетливое противовоспалительное, противоаллергическое, адаптогенное и репаративное действия.

Продукт применяется как в гигиенических целях с профилактическим действием, так и в виде монотерапии при проведении иммунореабилитационных мероприятий, в частности, при неполном выздоровлении после перенесенного заболевания, а также при комплексной терапии широкого спектра заболеваний органов дыхания одновременно с антибиотиками и противовирусными средствами.

Препарат обладает гипоаллергенным действием.

#### **ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:**

- Рецидивирующий бронхит
- Частые простудные заболевания
- Ринит
- Фарингит
- Ларингит
- Отит
- Ангина

#### **СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:**

Применять ректально.

Перед применением суппозиторий следует освободить от контурной упаковки. Чистыми руками аккуратно ввести суппозиторий в задний проход, лежа на боку. Вводить по 1 суппозиторию 2 раза/сутки в течение 30 дней. При необходимости возможно продление курса до 90 дней.

#### **ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ:**

Побочных действий не выявлено.

Не развивается зависимость и не возникает синдром отмены.

#### **ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:**

Противопоказаний не выявлено.

#### **ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:**

Продукт следует хранить в неповрежденной упаковке в холодном месте при температуре от +4 °С до +15°С.

#### **СРОК ГОДНОСТИ:**

Срок годности составляет 24 месяца с даты производства.

Не рекомендуется использовать продукт после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Комплексные средства серии **SCHALI® Care** производятся по лицензии No. 286-S